



GEMAK

Sorg pakket

Pfizer voorsien jou van die volgende pasiënt-sorgpakket om jou gedurende jou behandeling te help

Die volgende items is aan jou gegee in die **PASIËNT-GEMAKSPAKKET:**

- Waterbottel
- Lipbalsem
- Hakbalsem
- Bevogtigende handerूम
- Strooitjies
- Alkoholvrye mondspoelmiddel
- 1 boks met 'n rehidrasie-oplossing (mondelikse elektrolietmengsel)



Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.

MONDELIKSE REHIDRAAT



Gedurende die behandeling kan jy dalk diarree^{2,3}ervaar

Hier is 'n paar wenke¹

- Drink baie vloeistof, maar net 'n bietjie op 'n slag
- Vermy vloeistof met maaltye en vir 'n uur ná die tyd
- Eet en drink klein hoeveelhede, maar gereeld
- Vermy kos wat vetterig is, hoog is in vesel en baie speserye bevat
- Staak stoelgang-versagters en vesel-aanvullings (indien gebruik)
- Vermy kaffeïen
- **Praat met jou dokter of verpleegster vir meer raad**



Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.

LIPBALSEM



Gedurende die behandeling kan jy droë en gebarste lippe¹ervaar

Hier is 'n paar wenke om droë en gebarste lippe¹te verlig

- Gebruik gereeld lipbalsem
- Vermy alkohol en kos wat suur is en baie speserye bevat
- Vermy kos wat te warm of koud is
- Eet sagte kos
- **Praat met jou dokter of verpleegster vir meer raad**

Jy is van lipbalsem voorsien



Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.

VOETBALSEM



Jou voete kan gedurende behandeling¹seer word

Verhoog jou voetsorg¹

- Smeer genoeg voetbalsem aan
- Was met loutwarm water en druk dit droog
- Daar word voorgestel dat jy nie blase oopsny nie omdat dit dalk die probleem kan vererger
- **Praat met jou dokter of verpleegster vir meer raad**

Jy kan jou voete met hakbalsem versorg



Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.

KALMERENDE HANDEROOM



Uitslag en blase kan dalk gedurende die behandeling op jou hande verskyn^{2,3}

'n Paar nuttige wenke¹

- Smeer genoeg bevochtigers aan - veral ná 'n stort en voor jy gaan slaap
- Was met loutwarm water en druk dit droog
- Vermy wrywing of drukking op jou hande
- Dra lospassende katoenklere
- Dra sonskerm met 'n SPF van ten minste 30
- **Praat met jou dokter of verpleegster vir meer raad**

Jy kan die bevochtigende handeroom aansmeer



Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.

BEPLAN jou bederfies!



Beplan jou bederfies vir wanneer jy beter voel - dit sal jou iets gee om na uit te sien!

As jy moeg voel gedurende die behandeling¹

- Vat 'n breek of slaap vir 'n kort rukkie
- Eet goed en drink baie vloeistof
- Gaan stap 'n entjie of doen ligte oefening
- Doen aktiwiteite wat ontspannend is, soos om na musiek te luister of te lees
- Moenie 'n motor bestuur of masjinerie hanteer wanneer jy moeg voel nie
- **Praat met jou dokter of verpleegster vir meer raad**



Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.

ALKOHOLVRYE MONDSPOELMIDDEL



Jou mond kan dalk seer en/of geïrriteerd word gedurende die behandeling^{2,3}

Hier is 'n paar idees hoe om jou mond om dit te kry¹

- Vat klein slukkies vloeistof/drinkgoed met 'n strooitjie
- Spoel jou mond uit met 'n alkoholvrye mondspoelmiddel
- Borsel jou tande met 'n sagte tandeborsel nadat jy geëet het en voor jy gaan slaap
- Gebruik tandepasta wat nie peroksied bevat nie of maak 'n mondspoelmiddel van koeksoda wat in warm water opgelos is
- Gebruik 'n sagte tandeborsel of -gaas as jou tandvleis bloei
- **Praat met jou dokter of verpleegster vir meer raad**

Strooitjies en alkoholvrye mondspoelmiddel behoort verligting te verskaf



Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.



VRYSINGS: Hierdie aanbevelings vir die hantering van nuwe-effekte is gebaseer op die ervaring van Dr. Kollmannsberger, wat die outeur is van die artikel met die titel "Sunitinib therapy for metastatic renal cell carcinoma": aanbevelings vir hanteringsadvies en sulke besluite moet volgens die diskresie van die senior gesondheidsorgwerker wees. Verwys asseblief na jou gesondheidsorgwerker vir meer inligting.

Verwysings: **1.** Kollmannsberger C, Soulieres D, Wong R, Scalera A, Gaspo R, Bjarnason G. "Sunitinib therapy for metastatic renal cell carcinoma: recommendations for management of side effects. CUAJ 2007; 1(2 Supp); S41-S54. **2.** SUTENT® Pakket-insetel, 12 Julie 2021. **3.** INLYTA® Pakket-insetel, 19 Mei 2020

Pfizer Laboratories (Pty) Ltd. Company Reg. No. 1954/000781/07. Building 2, 1st Floor, Maxwell Office Park, Magwa Crescent, Waterfall City, Midrand, Johannesburg, South Africa. Tel. No: 0860 PFIZER (734937). Copyright © 2023. Pfizer Laboratories (Pty) Ltd. All rights reserved. PP-UNP-ZAF-0298